

진맥톤정 240mg은 혈류개선으로
 뇌 산소공급을 증가시키며,
 항산화 효과 및 신경세포망 강화를 통해
 신경세포를 보호 합니다.⁶⁾

Drug Information ⁷⁾

성분	은행엽건조엑스 (Ginkgo leaf dried extract) 240mg
효능/효과	집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥 경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하
용법/용량	성인 은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다. 식사와 관계없이 복용할 수 있다.
약가	500원/1T (비급여)
성상	녹색의 장방형 필름코팅정제
저장방법	기밀용기, 실온(1~30℃)보관
사용기간	제조일로부터 36개월
포장단위	30T, 500T (병)
제조사	풍림무약(주)

Ref) 6) Carlo Tomino, et al. *Pharmaceuticals* 2021, 14, 305(1-19). 7) 진맥톤정 240mg 허가증



한국파마 전국지점 / 제품문의 : 마케팅본부 (02)558-1277 www.koreapharma.co.kr
 본사·서울·병원·유통관리 02-558-1277 / 경인·수원 031-298-9351~2(경인), 031-257-2085~6(수원) / 대전 042-628-1340 / 부산 051-851-4968~9 / 대구 053-957-8624~5 / 마산 055-292-9789 / 광주 062-381-3879 / 전주 063-245-8302~3

사내 교육용

제작년월일 2023. 01. 25
 GMF-202401-004

Once daily for MCI *

진맥톤정 240mg
 (Ginkgo leaf dried extract 240mg)




건강한 미래 아름다운 동행




* Mild Cognitive Impairment

대한민국 65세 이상 인구 중
22.6%가 경도인지장애로 진단 받았습니다.¹⁾


① 경도인지장애 연도별 환자수(명)²⁾



② 경도인지장애 연도별 청구건수(건)²⁾



경도인지장애 환자의 약 10~15%는 1년 이내 치매로 진행되며,
80%는 6년 이내 치매 상태에 이릅니다.
치매 전단계부터 적극적인 관리 및 예방이 중요합니다.³⁾



Ref) 1) 중앙치매센터, 2) 심평원 빅데이터, 3) 보건복지부 치매교육자료

세계 여러나라에서 Ginkgo 제제는
경도인지장애 환자에게 권고되고 있습니다.

ASCEND*는 Ginkgo 제제를 경도인지장애 치료 옵션으로 권고 했습니다.⁴⁾

CLINICAL GUIDELINES

Strategies for the use of Ginkgo biloba extract, in the treatment and management of Mild Cognitive Impairment in Asia: Expert consensus

Ginkgo biloba extract, Summary of ASCEND expert consensus statements

Ginkgo biloba extract는 최소 4회 이상의 무작위 시험에서 MCI 증상의 개선을 입증했으며, MCI의 증상적 치료를 위해 기존 지침에서 권장되는 유일한 약물학적 제제 이다.	Class I Level A
Ginkgo biloba extract는 MCI 환자의 인지 능력을 향상 시킬 수 있다.	Class I Level A
Ginkgo biloba extract는 뇌혈관질환(CVD)을 동반한 MCI 환자에게 유용 할 것이다.	Class III Expert opinion

* ASCEND : Asian Clinical Expert group on Neurocognitive Disorders, 아시아신경인지질환전문가 그룹

여러 국가의 학회에서 경도인지장애의 치료 옵션으로
Ginkgo 제제를 권고하고 있습니다.⁵⁾

Management of Mild Cognitive Impairment (MCI): The need for national and a international guidelines

Country	Society	Type of guideline	Indication (criteria)	Pharmacological symptomatic treatments (level of evidence)	Control of CV risk factors (level of evidence)	Physical and cognitive activation (level of evidence)	Reference
Czech Republic	Society	consensus document	MCI (Preserved activities of daily living)	• Ginkgo biloba	No	No	(Jirak 2014; Jirak 2017)
Russia	RCMH/RMACPE	practice guidelines	MCI (MoCA, DSM-5)	• Ginkgo biloba (approved for MCI) • Citicolin, Actovegin, Piribedil, Piracetam for VCI • Other	Yes	Yes	(Gavrilova et al 2013; Bogolepova et al. 2017; Vasenina et al. 2017)
Spain	SEGG	consensus document	MCI (MoCA, CamCog)	• Ginkgo biloba (240mg dose approved for ACI) • Citicolin for VCI • Other	Yes	Yes	(Lopez Trigo 2017)
Switzerland		expert recommendation	MCI	• Ginkgo biloba	Yes	Yes	(Kressig 2015)
China	ADC	practice guideline	MCI	• Ginkgo biloba (EGb 761) • TCM	Yes	Yes	(Jia 2015; Alzheimer's Disease Chinese (ADC) 2017)
Asia		consensus document	MCI	• Ginkgo biloba (EGb 761)	Yes	Yes	(Kandiah et al. 2019)

Ref) 4) Nagaendran Kandiah, et al. CNS Neurosci Ther. 2019;25:288-298. 5) S. Kasper, et al. The World Journal of Biological Psychiatry 2020, VOL. 21, NO. 8, 579-594